

Caso 5

Paciente do sexo feminino, 32 anos, solteira, natural e procedente de Piripiri, Piauí. Apresentava queixa de icterícia há 3 meses em consulta de rotina. Refere dor em hipocôndrio direito, febre baixa (não aferida), calafrios, inapetência e emagrecimento de 2 kg em dois meses. Chega ao nosso serviço com uma ultrassonografia (USG) abdominal total que evidenciou dilatação das vias biliares intra e extra-hepáticas, ducto colédoco ectasiado (1,8cm), vesícula biliar hidrópica com bile espessa, sem evidências de cálculos em seu interior e ectasia do ducto pancreático principal (5,9mm).

Antecedentes pessoais de hepatite A (IgG+) e tabagismo (4 maço/ano), negava etilismo, pancreatite prévia, cirurgias prévias e outras comorbidades. Havia histórico familiar de câncer intestinal de tios e primos maternos e de doença cardiovascular na família paterna.

Ao exame físico apresentava-se ictérica +++/IV, descorada +/-IV, abdome plano, flácido, doloroso à palpação em mesogástrio e hipocôndrio direito, sem visceromegalias ou massas palpáveis.

Foi solicitada TC helicoidal que mostrou os seguintes achados, indicados nas setas:



- 1) Quais as estruturas apontadas nas duas imagens (TC)?
- 2) Quais exames complementares você solicitaria para o seguimento?
- 3) Qual(is) hipóteses diagnósticas?

